

## Dunbar-Syndrom – (Truncus-coeliacus-Kompressions-Syndrom)

Truncus-coeliacus-Kompression  
(meist) durch das  
Ligamentum arcuatum mediale

1

## Dunbar-Syndrom - Klinik

### TRIAS

- **Postprandiale Schmerzen** (94%)
  - auch nach körperlicher Belastung
  - auch in Ruhe
- **Gewichtsverlust**
- (Strömungsgeräusch)
- Übelkeit, Erbrechen, ....

→ «Wie eine Angina abdominalis.»

2

## Dunbar-Syndrom - Epidemiologie

- Leichen: 1/3 der Fälle
- ♀ : ♂ → 4 : 1
- ~ 47 Jahre

3

## Dunbar-Syndrom - Diagnostik

Diagnosesicherung: ~ 34 Monate

Mit Atemmanövern:

- CT- / MR-Angiographie
- Duplexsonographie

4

## Dunbar-Syndrom - Therapie

### Patientenauswahl

- + postprandialer Schmerz
- + 40 – 60 Jahre
- + starker Gewichtsverlust



Operative Dekompression  
78 – 96% schmerzfrei

- älter als 60 Jahre
- atypischer Schmerz
- Alkoholabusus/ psych. Erkrankung
- wenig Gewichtsverlust